



SKALA NYERI FLACC

Wajah

- 0 Tidak ada ekspresi yang khusus (seperti senyum).
- 1 Kadang meringis atau mengerutkan dahi, menarik diri.
- 2 Sering / terus menerus mengerutkan dahi, rahang mengatup, dagu bergetar .

Ekstremitas

- 0 Posisi normal / rileks.
- 1 Tidak tenang, gelisah, tegang.
- 2 Menendang atau menarik kaki.

Gerakan

- 0 Berbaring tenang, posisi normal, bergerak bebas.
- 1 Menggeliat-geliat, bolak-balik berpindah, tegang.
- 2 Posisi tubuh meringkuk, kaku, atau menyentak.

Menangis

- 0 Tidak menangis
- 1 Merintih, merengek, kadang mengeluh.
- 2 Menangis tersedu-sedu, terisak-isak, menjerit.

Kemampuan Ditenangkan

- 0 Senang, rileks
- 1 Dapat ditenangkan dengan sentuhan, pelukan, atau berbicara, dapat dialihkan.
- 2 Sulit/ tidak dapat ditenangkan dengan pelukan, sentuhan atau distraksi.

Penilaian:

Nyeri ringan : < 4

Nyeri sedang : 4 – 6

Nyeri berat : > 7

1. Jika terdapat nyeri dengan skor nyeri < 4 dilakukan penilaian ulang tiap 8 jam oleh perawat.
2. Bila skor nyeri ≥ 4 dokter DPJP harus melakukan penanganan terhadap nyeri sesuai dengan SPO manajemen nyeri.